

Auftragsformular Molekularpathologie

Auftraggeber: Spital/Arzt:	Patient:
Unterschrift:	Name :
	Vorname :
	Geb'datum : ☐ männlich ☐ weiblich
	Strasse/Nr.:
	Plz/Ort :
	Krankenkasse : _____
	☐ ambulant → Rechnung an Patient / an Krankenkasse / an ... ☐ stationär → Rechnung an Spital ☐ Rechnung an Auftraggeber

Berichtskopie an:

Klinische Angaben / Untersuchungsmaterial / Bemerkungen:

Klinische Angaben:

Untersuchungsmaterial: ☐ **Probe bei Pathologie Länggasse – Untersuchungs-Nr.:** _____
Auftrag übermitteln an Fax Nr 031 300 24 20 oder an info@patholaenggasse.ch

☐ Paraffinblock und HE-Schnitt beiliegend Bezeichnung: _____
 Auftrag einsenden an: Pathologie Länggasse, Postfach, 3001 Bern

Bemerkungen:

Mutationsanalysen:

Einzelne Gene (Sanger-Sequenzierung) (3-5 Arbeitstage)	Next-Generation Sequencing (NGS) (1.5 bis 2.5 Wochen)
☐ RAS: KRAS + NRAS sequentiell (je Exon 2, 3, 4) ☐ KRAS (Exon 2, 3, 4) ☐ KRAS G12C (Exon 2) ☐ NRAS (Exon 2, 3, 4) ☐ EGFR (Exon 18, 19, 20, 21) ☐ BRAF (Exon 15) ☐ BRAF inkl. Exon 11 (Exon 11, 15) ☐ KIT (Exon 9, 11, 13, 17) ☐ PDGFRA (Exon 12, 14, 18) ☐ ERBB2 (HER2) (Exon 20, 21) ☐ ESR1 (Exon 5, 6, 7, 8) ☐ PIK3CA (Exon 8, 10, 21) ☐ AKT1 (Exon 4) ☐ IDH1 und IDH2 (je Exon 4)	TruSight Oncology 500v2-Panel (illumina) Nennung prädiktiver Marker je nach Tumortyp ☐ TSO500v2 DNA/RNA/HRD (523/55 Gene, MSI, TMB, HRD) ☐ TSO500v2 DNA/HRD (523 Gene nur DNA, MSI, TMB, HRD) ☐ TSO500v2 RNA (55 Gene nur RNA) TruSight Tumor 15-Panel (illumina) Nennung prädiktiver Marker je nach Tumortyp ☐ TST15 (15 Gene DNA: AKT1, BRAF, EGFR, HER2, FOXL2, GNA11, GNAQ, KIT, KRAS, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, RET, TP53) Anmerkung: Falls das Ausgangsmaterial nicht für eine NGS-Analyse ausreicht, werden die prädiktiven Marker-Gene für die jeweilige Tumorentität soweit möglich per Sanger-Sequenzierung analysiert.

Andere PCR-basierte Untersuchungen:
Fragmentlängenanalysen: (2-4 Arbeitstage)

- ☐ **IgH Rearrangement** (schwere Kette des Immunglobulins)
- ☐ **TCR γ Rearrangement** (γ -Kette des T-Zell-Rezeptors)
- ☐ **MSI** (Mikrosatelliten-Instabilität)

Erreger: (1 bis 1.5 Wochen)

- ☐ **HPV:** Nachweis und Typisierung an **Gewebematerial**
- HPV an ThinPrep-Präparat:**
Für HPV-Nachweis und Typisierung an ThinPrep-Präparat bitte Einsendeformular 'Gynäkologische Zytologie' verwenden.
- ☐ **Mykobakterien** Nachweis und ggf. Typisierung
- ☐ **Bartonella henselae (CSD)** Nachweis

Mammakarziom: Genexpressionsanalyse
☐ **EndoPredict (1 bis 1.5 Wochen)**

Klin. Angaben: Tumorstadium pT _____, Nodalstatus pN _____, Tumorgad: _____

Tumor: ER-Status ☐ ER-positiv ☐ ER-negativ **HER2-Status** ☐ HER2-positiv ☐ HER2-negativ

Nur für Pathologie-internen Gebrauch:

Zuständige(r) Pathologe/in: (idR Befunder Erstbericht)	
Untersuchtes Material: (Organ, Tumortyp)	
Patho-Nr / Block (bitte Blockbez.: z.B. B1X.XXXXX 1-A):	
Tumorzellgehalt nach Makrodissektion: (= Tumorzellgehalt im HE-markierten Areal → für Mutationsanalysen und MSI bitte angeben.)	

Benötigtes Untersuchungsmaterial / Markierung der zu analysierenden Areale auf HE-Schnitt

- **Paraffinblock / Paraffinblöcke** (in Absprache mit Labor ev. Leerschnitte bzw. Zytologie-Präparate)
- **markierter HE-Schnitt.** HE soll aktuell sein und der Blockoberfläche entsprechen.

Je nach Analyse sind unterschiedliche HE-Markierungen erforderlich:

Mutationsanalysen Sanger:	Region mit höchstem Tumoranteil (mind. 40%); Areal-Durchmesser mind. 2 mm
Mutationsanalysen NGS:	Region mit höchstem Tumoranteil (mind. 20%); Areal-Durchmesser mind. 3 mm
Fragmenanalysen IgH + TCRγ:	Gesamte Region mit potentiell klonalen Zellen (Anteil > 5% der Gesamtzellzahl)
Mikrosatelliten-Instabilität (MSI):	Tumorgewebe (T) und Normalgewebe (NT) erforderlich. Falls NT auf Tumorblock nicht ausreichend → geeigneten Block (z.B. RR oder Nicht-Malignom; ev. frühere Einsendung) beilegen. HE-Markierung T: Region mit höchstem Tumoranteil (mind. 40%); Areal-Durchmesser mind. 2 mm HE-Markierung NT: Region mit mind. 90% Normalgewebe (gleicher Typ wie Tumor; kein Fett-/Bindegewebe)
HPV-Analyse Gewebematerial:	Potenitiell am stärksten infizierte Region; Durchmesser max. 5 mm
Mykobakterien/Bartonella henselae:	Potenitiell am stärksten infizierte Region; Röllchen od. Durchmesser mind. 5 mm
EndoPredict:	Gesamte Region mit Tumoranteil (ohne Fettgewebe) von mind. 30% umkreisen. Wenn möglich DCIS vermeiden . Keine Tuscherückstände in markierter Region. Falls Ki-67 heterogen: Region mit höchstem Ki-67-Index umkreisen.

Checkliste: EndoPredict-Voraussetzungen:

Endopredict: geeignet für **post- und prämenopausale Patientinnen** (LoE IB für post-, LoE IIB für prämenopausale Patientinnen)

Tumoranteil (ohne Fettgewebe)

Tumorstadium T1-2

axilläre Lymphknoten

ER und / oder PR

HER2 → bei IHC 2+ zuerst FISH durchführen

>30%	☐
T1, T2	☐
0-3 pos	☐
pos.	☐
neg.	☐

↓
EndoPredict

<30%	☐
T3, T4	☐
> 3 pos.	☐
neg.	☐
pos.	☐

↓
KEIN EndoPredict